Alrijne

Interne Geneeskunde

Rituximab behandeling bij bloedziekten

Contactgegevens ziekenhuizen van Alrijne

Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 582 8282

Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2402 WC Alphen aan den Rijn
071 582 8282

www.alrijne.nl

U krijgt het medicijn Rituximab voor de behandeling van immuun trombocytopenie (ITP) of auto-immuun hemolytische anemie (AIHA). Deze behandeling vindt plaats op de afdeling Dagverpleging. In deze folder leest u meer over dit geneesmiddel.

In het kort

- **U krijgt Rituximab via een infuus. U krijgt 4 behandelingen.**
- **Uw afweer tegen ziekten wordt minder goed.**
- **U kunt overgevoelig zijn voor Rituximab.**
- **Voor elke behandeling moet u thuis speciale medicijnen innemen.**
- **Iemand moet u naar het ziekenhuis brengen en weer ophalen.**
- **Als u last heeft van bijwerkingen moet u ons bellen.**

Wat is Rituximab?

Rituximab is een medicijn dat ervoor zorgt dat het afweersysteem van het lichaam minder goed werkt. Bij ITP zorgt dit medicijn dat er minder bloedplaatjes worden afgebroken. U krijgt dus meer bloedplaatjes in uw bloed.
Bij AIHA zorgt dit medicijn ervoor dat de B-cellen dood gaan (B-cellen zijn een bepaald soort afweercellen). Men hoopt zo de bron van de auto-antistoffen tegen de aanmaak van bloedplaatjes of rode bloedcellen uit te schakelen.

De behandeling

U krijgt de Rituximab via een infuus. U krijgt in totaal 4 behandelingen.

De eerste behandeling
De eerste behandeling vindt plaats op de afdeling Dagverpleging (route 430) in **Alrijne in Leiderdorp**. Deze eerste behandeling duurt ongeveer 6 uur.

U krijgt Rituximab toegediend via een infuus. Dit infuus is aangesloten op een infuuspomp. De infuuspomp wordt elke 30 minuten iets sneller gezet. Wij kijken hoe u op het middel reageert. We meten uw bloeddruk, hartslag en temperatuur. En we kijken of u last heeft van bijwerkingen.

De volgende 3 behandelingen
De tweede behandeling krijgt u een week later.

Als u tijdens de eerste behandeling geen allergische klachten kreeg, duren volgende 3 behandelingen elk ongeveer 2 uur. De behandelingen vinden dan plaats in **Alrijne in Leiden (afdeling 3B)**.

Overgevoelig zijn voor Rituximab
Rituximab bestaat voor een gedeelte uit een eiwit dat afkomstig is van muizen. Sommige mensen zijn hier overgevoelig (= allergisch) voor. Daarom krijgt u speciale medicijnen die u van tevoren thuis moet innemen. Door deze medicijnen heeft u minder kans op een allergische reactie en op klachten zoals jeuk, rilligheid, kortademigheid of huiduitslag. Als u toch een allergische reactie krijgt, dan zetten we de infuuspomp stop of langzamer. Als dat nodig is krijgt u een middel tegen de allergie.

Wat u thuis moet doen voordat u naar het ziekenhuis komt voor de behandeling

1 uur voordat u het infuus met Rituximab krijgt, slikt u de volgende tabletten:

- 1 tablet Levocetirizine 5 mg .
- 2 tabletten Paracetamol à 500 mg.

U mag de tabletten met water innemen.

Na de behandeling

Belangrijk om te weten:

- Het middel Levocetirizine kan als bijwerking slaperigheid geven. Als u last heeft van deze bijwerking, mag u geen autorijden. Wij adviseren u daarom na de eerste behandeling niet zelf te rijden. Zo kunt u ontdekken of u last krijgt van deze bijwerking. Als u niet slaperig wordt van Levocetirizine kunt u na de volgende behandelingen zelf rijden.
- Voor zover wij weten, kunt u Rituximab veilig gebruiken naast andere medicijnen. Overleg met uw arts als er iets verandert in de medicijnen die u gebruikt.
- Als u Rituximab gebruikt, heeft u meer kans op infecties. Bijvoorbeeld bij operaties en andere ingrepen (ook ingrepen die de tandarts doet). Vraag dan aan uw arts of het nodig is dat u tijdelijk stopt met de behandeling met Rituximab. Krijgt u een behandeling bij de tandarts? Vertel dan aan uw tand(arts) dat u Rituximab gebruikt. Dan kan uw tandarts daar rekening mee houden.

Bijwerkingen

Door de behandeling met Rituximab wordt uw afweer minder goed. Daardoor heeft u meer kans op infecties. Dit kan duren tot wel 6 – 12 maanden na de behandeling.
Belangrijk is om te weten: een deel van uw afweersysteem blijft gewoon werken, ook als u wordt behandeld met Rituximab.

Neem direct contact op met uw behandelend arts bij:

- Wondjes aan de huid die ontstoken zijn (bijvoorbeeld roodheid rond de wond of pus)
- Een urineweginfectie (blaasontsteking, vaak en kleine beetjes plassen)
- Voorhoofdsholteontsteking, hoofdpijn of keelpijn
- Ontstoken kiezen en tanden
- Koorts als verschijnsel van infectie, ook van uw gewrichten
- Hoesten en kortademig
- Als u regelmatig bloedneuzen krijgt of blauwe plekken

Vaccinaties

Omdat u een auto-immuun ziekte heeft en daarvoor medicijnen gebruikt, adviseren wij u om ieder jaar de griepprik te halen bij uw huisarts. Heeft u een andere vaccinatie (bijvoorbeeld COVID-19) nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw specialist, huisarts of apotheek.
Wilt u een verre reis maken? Bespreek dit dan met uw behandelend arts vóórdat u start met Rituximab.

Bepaalde vaccinaties werken namelijk minder goed als u Rituximab gebruikt.
Wij raden de vaccinatie met een verzwakt levend vaccin af tijdens het gebruik van Rituximab.
Bijvoorbeeld vaccinaties tegen bof-mazelen-rode hond (BMR), gele koorts, oraal poliovaccin of BCG.

Contact

De verpleegkundige van polikliniek Interne Geneeskunde is bereikbaar via telefoonnummer 071 582 8535 of via email oncologie@alrijne.nl. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 15.30 uur.

Spoed: In de avond, nacht en weekenden kunt u bij spoed bellen met het algemene nummer van het ziekenhuis 071 582 8282. Vraag naar de dienstdoende internist.

Tot slot

Wat neemt u mee?

- uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
- uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.

Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Foldernummer 12.36, 08_25