

Plastische Chirurgie / Hand- en Polscentrum

# Reusceltumor van de peesschede

## Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden  
Houtlaan 55  
2334 CK Leiden  
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp  
Simon Smitweg 1  
2353 GA Leiderdorp  
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn  
Meteoorlaan 4  
2401 WC Alphen aan den Rijn  
0172 467 467

**U heeft een reusceltumor van de peesschede. In deze folder leest u wat een reusceltumor is en hoe deze kan worden behandeld. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.**

## Wat is een reusceltumor van de peesschede?

De reusceltumor van de peesschede is een van de meeste voorkomende goedaardige tumoren in de hand. Deze tumoren voelen in tegenstelling tot een ganglioncyste stevig aan. De tumor is goedaardig maar kan zich agressief gedragen. Het groeit namelijk overal tussendoor en kan pezen en ligamenten van gewrichten en zelfs het bot aantasten.

## Oorzaak

De tumor bestaat uit de zogenaamde reuscellen. De oorzaak van het ontstaan van de reusceltumor is onbekend. De tumor ligt vaak naast een eindgewricht. De tumor komt het vaakst voor bij vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. Een reusceltumor hoeft geen klachten te geven. Als de zwelling zich vlakbij een gewricht bevindt kan het klachten geven. De klachten kunnen bestaan uit lokale zwelling, pijn tijdens belasten en soms een bewegingsbeperking van het gewricht.

## Behandeling

De plastisch chirurg stelt de diagnose aan de hand van een lichamelijk onderzoek en een röntgenfoto. Soms is het ook nodig om een CT-scan of een MRI-scan te maken.

De reusceltumor wordt operatief verwijderd. De operatieve ingreep kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. De reusceltumor wordt verwijderd. Hierna wordt de wond met hechtingen gesloten.

## Nabehandeling

Na de operatie krijgt u een verband om de vinger, let erop dat het verband niet nat wordt. Na twee dagen mag u het verband zelf verwijderen. Hierna mag de wond wel nat worden.

De hechtingen worden na 10-12 dagen op de polikliniek Plastische Chirurgie verwijderd.

Als bewegen na de operatie niet goed lukt kan een verwijzing naar de handtherapeut noodzakelijk zijn. Deze begeleidt u tijdens het herstel en helpt u de hand weer zo goed mogelijk te gebruiken.

## Bereikbaarheid polikliniek Plastische Chirurgie

De polikliniek Plastische Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8061 (alle locaties).

De polikliniek Plastische Chirurgie Leiden heeft routenummer 15

De polikliniek Plastische Chirurgie Leiderdorp heeft routenummer 141

De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Alphen aan den Rijn heeft routenummer 38

De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantooruren telefonisch te bereiken via 071 582 8905.

Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.