

Longziekten

Bronchiale provocatietest

MEDICATIE VOOR DEZE TEST ALTIJD STOPPEN! (zie volgende pagina)

Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2401 WC Alphen aan den Rijn
0172 467 467

Stakingsvoorschrift medicatie bij de bronchiale provocatietest

1 week van tevoren stoppen met:

Anoro (vilanterol/umeclidinium)	Tiotrus (tiotropium)
Bevespi (glycopyrronium/formoterol)	Trelegy (fluticason/vilanterol/umeclidinium)
Incruse (umeclidinium)	Trimbow (beclometason/formoterol/ glycopyrronium)
Seebri (glycopyrronium)	Ultibro (indacaterol/glycopyrronium)
Spiriva (tiotropium)	Xoterna (indacaterol/glycopyrronium)
Spiolto (olodaterol/tiotropium)	

72 uur (3 dagen) van tevoren stoppen met:

Aerius, Neoclarityn (desloratadine)	Primatour (chloorcyclizine/cinnarizine)
Allerfre, Claritine (loratadine)	Promethazine
Cinnarizine	Reactine (cetirizine)
Cyclizine	Rupafin (rupatadine)
Emesafene (meclozine/pyridoxine)	Semprex (acrivastine)
Fenistil	Suprimal (meclozine)
Hydroxyzine	Tavegyl (clemastine)
Kestine (ebastine)	Telfast (fexofenadine)
Ketotifen, Zaditen	Toplexil (oxomemazine)
Mizollen (mizolastine)	Xyzal (levocetirizine)
Nedeltran (Alimenazine)	Zyrtec (cetirizine)
Prevalin allerstop (cetirizine)	

48 uur van tevoren stoppen met:

Daxas (roflumilast)	Striverdi (olodaterol)
Onbrez (indacaterol)	Theolair (theofylline)
Relvar (fluticasonfuroaat/vilanterol)	Unilair (theofylline)

36 uur van tevoren stoppen met:

Aerivo (salmeterol/fluticason)	Flutiform (formoterol/fluticason)
AirFluSal (salmeterol/fluticason)	Foradil (formoterol)
Atimos (formoterol)	Foster (formoterol/beclometason)
Bufoleer (formoterol/budesonide)	Oxis (formoterol)
Busalair (salmeterol/budesonide)	Semprex (acrivastine)
Duaklir (formoterol/aclidinium)	Seretide (salmeterol/fluticason)
DuoResp (formoterol/budesonide)	Serevent (salmeterol)
Eklira (aclidinium)	Singulair (montelukast)
Elpenhaler (salmeterol/fluticason)	Symbicort (formoterol/budesonide)

12 uur van tevoren stoppen met:

Atrovent (ipratropium)
Berodual (fenoterol/ipratropium)
Combivent (salbutamol/ipratropium)

6 uur van tevoren stoppen met:

Airomir (salbutamol)
Bricanyl (terbutaline)
Ventolin (salbutamol)

Het is niet nodig om te stoppen met:

Alvesco (ciclesonide)	Pulmicort (budesonide)
Flixotide (fluticason)	Qvar (beclometason)

Uw behandelend arts heeft voor u een bronchiale provocatietest aangevraagd. In deze folder geven we informatie over dit onderzoek. Om het onderzoek goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de raadgevingen van uw behandelend arts nauwkeurig op en lees deze informatie goed door.

Doel van het onderzoek

De bronchiale provocatietest is een functieonderzoek om de gevoeligheid van de luchtwegen te bepalen.

Vorbereiding

- U hoeft geen speciale kleding te dragen.

- Zware inspanning dient u ten minste twee uur vóór de test te vermijden.
- U mag vooraf gewoon eten en drinken.
- Er kunnen in principe geen andere mensen bij het onderzoek aanwezig zijn.
- Zorg dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint en zorg dat u op tijd aanwezig bent.

Vooraf stoppen met uw longmedicijnen!

Het is absoluut noodzakelijk om vóór de bronchiale provocatietest op de juiste wijze te stoppen met het innemen van uw longmedicatie. De voorschriften hiervoor zijn per medicijn verschillend. Kijk voor de voorschriften over uw medicatie op het *schema op de pagina's 1 en 2*.

Let op: Bent u niet op tijd gestopt met uw longmedicatie dan kan de test niet doorgaan.

Alle overige medicatie die u gebruikt, kunt u gewoon nemen. Staat uw longmedicatie niet op de stakingslijst, neemt u dan contact op met de longfunctieanalist over wel of niet door gebruiken.

Afspraak

Wij verwachten u op de dag van het onderzoek op de afgesproken tijd in:

- Alrijne Ziekenhuis Leiden (route 45). U hoeft zich niet te melden, u kunt plaatsnemen in de wachtkamer.
- Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp (route 107). U meldt zich bij de balie van de polikliniek Longziekten.

Het onderzoek

Een longfunctieanalist voert het onderzoek uit. Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U krijgt een mondstukje in uw mond dat verbonden is met meetapparatuur. Ook krijgt u een klemmetje op de neus om ervoor te zorgen dat u door de mond ademt.

Wij vragen u om heel diep in te ademen en heel hard uit te blazen. Hierna ademt u een vernevelde vloeistof (methacholine of histamine) in via een tweede mondstuk.

Na het inademen wordt u weer gevraagd heel diep in te ademen en heel hard uit te blazen. Vervolgens wordt het inademen van de vernevelde vloeistof een aantal keren herhaald, in een steeds hogere concentratie.

De test stopt als alle concentraties zijn ingeademd of eerder als u minder hard kunt uitblazen en er een daling is van 20% op de hoeveelheid lucht die u hard uitblaast. Door deze daling kunt u kortademig worden. Dit wordt door toediening van medicatie weer verholpen. Het kan zijn dat u tijdens dit onderzoek meer gaat hoesten, als het harde uitblazen niet minder wordt, gaat het onderzoek gewoon door.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Hoe wordt het onderzoek ervaren?

De bronchiale provocatietest is pijnloos, wel kunt u lichte klachten van kortademigheid krijgen, of wat meer gaan hoesten.

Uitslag

Heeft u na de bronchiale provocatietest een afspraak bij uw behandelend arts, dan bespreekt deze de uitslag met u.

Tot slot

Wat neemt u mee?

- uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
- uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.

Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.

Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan gerust aan de longfunctieanalist:

- Alrijne Ziekenhuis Leiden: telefoonnummer 071 517 8329.
- Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: telefoonnummer 071 582 8734.
- Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn: telefoonnummer 0172 467392.

Heeft u nog vragen over uw afspraak of wilt u deze verzetten, belt u dan het Afsprakenbureau, telefoonnummer 071 515 55 43, of de polikliniek Longziekten, te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 13.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer 071 582 8053.