

Radiologie / Orthopedie / Chirurgie

Behandeling met corticosteroid

Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2401 WC Alphen aan den Rijn
0172 467 467

U krijgt corticosteroïd prikken. In deze folder staat meer informatie hierover.

Waarom krijgt u een prik met corticosteroïden?

Een prik met een corticosteroïd zorgt ervoor dat een eventuele ontsteking wordt tegengehouden. Hierdoor kunt u minder last hebben van pijn en beter bewegen. De prikken helpen goed bij veel patiënten.

Nadat u de prik heeft gekregen, kan het even duren voordat het medicijn helpt. Hoe lang het helpt, is wisselend. Soms enkele weken, soms veel langer en soms verdwijnt de pijn helemaal.

Welke medicijnen krijgt u?

De prik die u krijgt bestaat uit 2 medicijnen:

1. een verdovingsmiddel: dit zorgt ervoor dat u minder pijn heeft na de prik.
2. een ontstekingsremmer (corticosteroïd): dit zorgt ervoor dat de ontsteking wordt tegengehouden. Hierdoor kunt u minder last hebben van pijn en beter bewegen.

Wat zijn de bijwerkingen?

Vaak:

- Meer pijn. De eerste dagen na de prik kan de pijn wat erger worden. Dit is normaal. Soms kan de prikplek wat warm en dik aanvoelen. Een pijnstiller of ice-pack kan dan helpen.
- Uw gezicht kan rood worden. Meestal is dit binnen een paar dagen weer weg.
- U kunt last krijgen van opvliegers.
- Problemen met de menstruatie. Dit kan door meer/minder hormonen in uw lichaam.

Heel soms:

- Problemen met de bloedsuikerspiegel bij mensen met suikerziekte. Advies: controleer regelmatig uw bloedsuiker in de eerste 1 à 2 weken.
- Problemen met uw huid: zoals dunner worden, stugger worden of verkleuren van de huid.
- Er is een hele kleine kans dat u allergisch bent voor de prik.

Waar moet u op letten?

Doen: Voorzichtig bewegen zover u kunt, tot u pijn krijgt. Heeft u pijn, neem dan eventueel medicijnen tegen de pijn. Of gebruik ice-packs.

Niet doen: Te veel doen en net doen of er geen pijn is. Krijgt u fysiotherapie? Start dan pas na ongeveer een week.

Contact opnemen

Neem contact met ons op: als de plaats van de prik rood wordt, warm wordt of dikker wordt of als u koorts krijgt (temperatuur boven 38,5 °C).

Polikliniek Chirurgie: 071 582 8045

Polikliniek Orthopedie: 071 517 8122

Afdeling Radiologie: 071 582 8071