



Radiologie

Vacuümbiopsie van een fibroadenoom

Contactgegevens ziekenhuizen van Alrijne

Leiden

Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 582 8282

Leiderdorp

Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alphen aan den Rijn

Meteoorlaan 4
2402 WC Alphen aan den Rijn
071 582 8282

U krijgt een vacuümbiopsie van een fibroadenoom. Dit is een behandeling om een fibroadenoom te verwijderen. Deze behandeling wordt gedaan door een radioloog en een MBB'er (Medisch beeldvormend en bestralings deskundige).

In deze folder leggen we uit hoe deze behandeling gaat. Ook leest u hoe u zich moet voorbereiden. Lees daarom deze folder goed door.

In het kort

- **Bij u wordt een fibroadenoom verwijderd. Dit doet een radioloog.**
- **Slik 1 uur voor de behandeling 2 tabletten paracetamol van 500 mg.**
- **Eerst maakt de radioloog een echo.**
- **Daarna verdooft de radioloog de borst.**
- **Met een speciale naald verwijdert de radioloog het fibroadenoom.**
- **Op het wondje komt een pleister en een drukverband.**
- **De behandeling duurt ongeveer 1 uur.**
- **Doe de eerste 7 dagen na de behandeling rustig aan.**

Belangrijk

Bel met de polikliniek Borstkankerzorg als u:

- **zwanger bent of als u zwanger zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft.**
- **overgevoelig bent voor verdoving;**
- **bloedverdunnende medicijnen gebruikt.**

De afspraak bij afdeling Radiologie

Zwangerschap/borstvoeding

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan aan de baliemedewerker of aan de MBB'er. Dan kan het zijn dat deze behandeling niet doorgaat.

Overgevoeligheid voor de verdoving

U krijgt een verdoving: lidocaïne met adrenaline (epinefrine). Ook tandartsen gebruiken dit middel. Bent u overgevoelig voor dit middel? Meld dit dan vóór de behandeling. De radioloog gebruikt dan een ander verdovingsmiddel.

Bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Is dit niet met u besproken, neemt u dan contact op met de polikliniek Borstkankerzorg.

Waarom krijgt u dit onderzoek?

U heeft een fibroadenoom in uw borst. Dit is gezien op de foto's en/of een echografie van uw borst. U wilt het fibroadenoom laten verwijderen.

De radioloog verdooft de borst. Daarna haalt hij/zij zoveel mogelijk van het fibroadenoom weg. Dit gebeurt met een speciale naald. Meestal wordt de naald maar 1 keer ingebracht in de borst.

Met behulp van een vacuümsysteem wordt telkens een reepje van het fibroadenoom afgesneden en in de naald gezogen.

De stukjes weefsel gaan naar het laboratorium. Daar zal een patholoog het weefsel onderzoeken.

De dag van het onderzoek

Vorbereiding thuis

- Smeer geen bodylotion op uw huid.
- Draag kleding die lekker zit.
- Neem een stevige bh mee, bijvoorbeeld een sport bh.
- Neem 1 uur voor de behandeling 2 tabletten paracetamol van 500 mg in.
- Wij raden u aan iemand mee te nemen, zodat u niet alleen naar huis hoeft.

Aanmelden bij de afdeling Radiologie

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de polikliniek Borstkankerzorg in Alrijne in **Leiden**, routenummer 65.

Het behandeling

- Als u aan de beurt bent, haalt een MBB'er u op uit de wachtkamer. Zij brengt u naar een kleedkamer en vraagt u uw bovenkleding uit te doen.
- Bij de behandeling gebruiken we een echoapparaat om te kijken waar het fibroadenoom precies zit.
- U ligt voor deze behandeling op uw rug op een onderzoekstafel.
- Eerst zoekt de radioloog met het echoapparaat het fibroadenoom op. Daarna verdooft de radioloog de prikplaats. Door de verdoving zult u niets of weinig voelen van het wegnemen van het weefsel.
- Dan brengt de radioloog de biopsienaald in. Dit is een holle naald die weefsel wegsnijdt en opzuigt. De radioloog controleert met het echoapparaat of de naald op de goede plek zit. Daarna haalt zij/hij zoveel mogelijk weefsel weg. Zodra er genoeg weefsel is verwijderd, haalt de radioloog de naald uit de borst.
- Tijdens de behandeling ligt u 20 - 30 minuten zo stil mogelijk op de onderzoekstafel.
- De prikplaats wordt 10 minuten goed aangedrukt. U krijgt een speciale pleister op het wondje. Ook krijgt u een drukverband: een tampon en een gaas met een pleister eroverheen. Samen met de bh wordt de prikplaats zo goed dichtgedrukt.

Hoe lang duurt de behandeling?

Het hele onderzoek duurt ongeveer 1 uur (uitleg van tevoren, voorbereiding, onderzoek en de nazorg).

Weer naar huis

Als het goed met u gaat, mag u naar huis. Wij raden u aan iemand mee te nemen, zodat u niet alleen naar huis hoeft.

Adviezen voor thuis

- Wij adviseren u om tot 7 dagen na de behandeling rustig aan te doen. Doe geen zwaar werk en ga niet tillen/ sporten.
- De 2 nachten na de behandeling moet u uw bh aanhouden. Zo heeft de borst extra steun.
- Zorg ervoor dat het drukverband 24 uur op zijn plaats blijft zitten. Daarna mag u het drukverband

eraf halen. De pleisters moeten blijven zitten.

- Na 24 uur mag u weer douchen zonder het drukverband. Maak de huid en de pleister goed droog door te deppen.
- Zolang de pleisters nog op het wondje zitten mag u niet in bad, naar de sauna of zwemmen.
- Na 5 tot 7 dagen mag u zelf de pleisters eraf halen.
- Wij adviseren u om op de dag van het onderzoek om de 6 uur 2 tabletten paracetamol 500 mg in te nemen. Als u de dagen erna nog pijn heeft, kunt u paracetamol innemen als dat nodig is. Neem geen Aspirine! Aspirine is een bloedverdunnend medicijn, waardoor de kans op nabloeding groter is.
- Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, kunt u hier weer mee beginnen na overleg met uw behandelend arts.

De uitslag

- De radioloog maakt een verslag van de behandeling en stuurt dit naar uw behandelend arts.
- De patholoog heeft ongeveer 1 week nodig om het weggehaalde weefsel te onderzoeken.
- De controle-afspraken bij uw behandelend arts is ongeveer 1 week na het onderzoek. Dan hoort u de uitslag van het onderzoek.

Tot slot

Wat neemt u mee?

- uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
- uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.

Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.

Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Bereikbaarheid

Telefoonnummer afdeling Radiologie polikliniek Borstkankerzorg (alle locaties): 071 582 8987.

De afdeling Radiologie is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

Bij problemen buiten kantoortijden kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) via telefoonnummer 071 582 8282.